

# توقف پشه ببری



پشه های ببری مهاجم که اغلب روزها فعالیت دارند به منطقه ما رسیده اند به طور بالقوه می توانند بیماری ها را منتقل کند. پشه های ببری تخم ها و لاروهای خود را در آب راکد می گذارد. بنابراین: تعویض مکرر آب یا عدم وجود آب راکد باعث میشود از انتشار آنها جلوگیری شود.

از جمع شدن آب در هر مکانی جلوگیری کنید.

زیرگلدانی ها را بردارید یا مرتب آنها را خالی کنید.

بشکه های باران را بپوشانید و مطمئن شوید که هیچ گودالی یا محلی برای تجمع آب روی پوشش وجود ندارد. آبپاش های آبیاری را برعکس بذارید.

زیاله ها را فوراً دور بیندازید یا در سطل دردار محفوظ نگه دارید.

آب حوضچه های آب بازی را باید هر هفته تعویض کنید. این موضوع در حوضچه هایی که زیستگاه طبیعی هستند صدق نمی کند چون در آنجا شکارچیان حشره خوار زیادی وجود دارند.

بعد از انجام این موارد: از فصل گرم بدون پشه ببری لذت ببرید.



اطلاعات بیشتر در مورد پشه ببری - ظاهر، شیوع، و غیره - و همچنین مرکز گزارشات

مربوط به موارد مشکوک را می توان در: [www.kantonslabor.bs.ch/tigermuecke](http://www.kantonslabor.bs.ch/tigermuecke) [www.neobiota.bl.ch](http://www.neobiota.bl.ch)

